FIGURA 15.4 Diagrama esquemático dos principais componentes estruturais da parede celular primária e seu provável arranjo. As microfibrilas de celulose são revestidas com hemiceluloses (como o xiloglucano), que podem também ligar as microfibrilas entre si. As pectinas formam um gel de matriz de ligação, talvez interagindo com proteínas estruturais (Brett e Waldron, 1996).

(A)

Site of synthesis for:

Cellulose
Callose

Site of synthesis for:

Pectins
HGA
RG I
RG II

Cross-linking glycans
Xyloglucan
Glucuronarabinoxylan
 β -Glucan
Galactomannan

Site of glycosylation of:

HRGPs
AGPs
Modified glycoproteins

Site of synthesis for:

Cell wall proteins
HRGPs
PRPs
GRPs
AGPs

Enzymes
Hydrolases
Esterases
Peroxidases
Polysaccharide
synthase

As proteínas estruturais de parede celular são classificadas em:

- proteínas ricas em hidroxiprolina (HRPG)
- proteínas ricas em glicina (RGPs)
- proteínas ricas em prolina (PRPs)
- proteínas arabinogalactanas (AGPs)

- HRGP → floema, câmbio, esclereídeos
- PRP → xilema, fibras, córtex
- GRP → xilema
- AGP → encontradas na parede celular ou associadas à membrana plasmática → apresenta padrões específicos de tecidos e células.

Enzimas

- peroxidases, fosfatases, invertases, α -manosidases, β -manosidases, β -1,4-glicanases, poligalacturonases, pectina metilesterases, arabinosidases, α -galactosidases, β -galactosidases, β -glicoronosidases, β -xilosidases, proteases.

Mecanismo de defesa

- As plantas são organismos sedentários e como tais são alvos fáceis para predadores e patógenos.
- Durante a evolução muitas barreiras de defesa tem sido selecionadas e assim permitindo umas parcial ou total proteção contra invasores e conseqüentemente a sobrevivência das plantas.
- Estas defesas são representadas por componentes estruturais das células e por toxinas as quais são metabólitos secundários e inibidores de proteínas.

- as próprias células constituem barreiras naturais ao ataque das plantas aos patógenos.
- Os sistema radicular é protegido por tecido epidérmico rico em celulose, substâncias que, juntamente com os derivados **pécticos** e **hemiceluloses**, recobre também espaços intercelulares.
- A epiderme dos caules verdes, folhas e frutos contém uma película externa composta por cutina e ceras, denominada **cutícula**.

- Celulose, cutina e substâncias cerosas são materiais de alta estabilidade química e de degradação relativamente difícil.
- Os troncos e os galhos de árvores são recobertos por tecido corticoso, dotado principalmente de **suberina**, capaz de resistir à ação degradativa de um grande número de diferentes microrganismos.

- **Papilas** → alteração na parede celular em resposta á penetração ou tentativa de penetração por microrganismos.
- Forma-se na face interna da parede celular abaixo do ponto de penetração de fungos e em resposta a algumas bactérias.
- Nas papilas, lignina, polifenóis, calose suberina e celulose formam barreiras visco-elásticas contra a força mecânica de penetração exercida pelo patógeno.

Calose → polissacarídeo constituído de moléculas de glicose unidas por ligação β -(1-3).

- **Lignificação e suberificação** → células com parede lignificada são mecanicamente mais rígidas e mais resistentes à degradação por enzimas secretadas por patógenos.
- **Reação de hipersensibilidade**, ou seja, a morte rápida de células da hospedeira em torno do ponto de penetração do patógeno.

Células de Citrus cultivadas em suspensão

- **Fitoalexinas** → são moléculas lipofílica, possuem pequeno peso molecular.
- São produzidas justamente no ponto de infecção, porém, um mensageiro sistêmico predispõe toda a planta a produzir rapidamente a fitoalexina.
- Gliceolina – soja
- Pisatina – ervilha
- Faseolina – feijão

- Os **elicitores** são moléculas responsáveis pela indução de substâncias do mecanismo de defesa das células vegetais.
- alguns componentes da parede celular podem ter função **elicitora** e induzir a síntese de lignina → monômeros de substâncias pécticas → alguns fungos produzem pectinase → leva a degradação de pectinas → estimula a produção de lignina.
- Podem ser exógenos ou endógenos.
- **Exógenos** → são compostos derivados do patógeno, tais como proteínas, glicoproteínas e vários oligossacarídeos.

- Enzimas pectolíticas produzidas pelos patógenos liberam uma fração péctica da parede celular da hospedeira e estas funcionariam como **elicitores endógenos**, ou seja, oriundos da própria hospedeira.
- As plantas podem produzir **quitinases** enzimas capazes de degradar a quitina da parede celular dos fungos e com isso liberar **elicitores**.
- O tamanho dos fragmentos e a sua concentração são muito importante para ser efetivo no mecanismo de defesa.
- Em um cultivar suscetível, o elicitor não é liberado na forma adequada → a lignificação não ocorre.

FIGURA 15.28 Esquema para a produção de oligossacarinas durante invasão fúngica de células vegetais. Enzimas secretadas pela planta, como quitinase e glucanase, atacam a parede fúngica, liberando oligossacarinas que provocam a produção de compostos de defesa (fitoalexinas) na planta. Similarmente, a pectinase fúngica libera oligossacarinas biologicamente ativas da parede celular da planta (Brett e Waidron, 1996).

Structure	Abbreviations		Structure	Abbreviations	
	Old	New		Old	New
$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{Fuc} \end{array} $	XG10	XLFG	$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glucitol} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \\ \text{Xyl} \\ \uparrow \\ \text{Gal} \\ \uparrow \\ \text{Fuc} \end{array} $	XG7-ol	XXXGol
$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Fuc} \end{array} $	XG9	XXFG	$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \\ \text{Xyl} \\ \uparrow \\ \text{Gal} \\ \uparrow \\ \text{Fuc} \end{array} $		XXG
$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{Fuc} \end{array} $	XG9n	XLLG	$ \begin{array}{cccccccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \quad \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{Gal} \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \quad \quad \text{Ara} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \downarrow \\ \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \quad \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{Fuc} \end{array} $		XXXGXXXG
$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \end{array} $	XG8	XXLG	$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Fuc} \end{array} $		XXFGXXG
$ \begin{array}{cccc} \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \rightarrow \text{Glc} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \quad \text{Xyl} \\ \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \text{Gal} \end{array} $		XLXG			

Fig. 1. Abbreviated nomenclature of some xyloglucan oligosaccharides. Sugar residues and their linkages are represented as follows: Ara α -L-arabinofuranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)-, Fuc α -L-fucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)-, Gal β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)-, Glc β -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- [or reducing D-glucose], Xyl α -D-xylopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 6)-.